

# PENDAISON

**D. CAILLOCE**  
**SAMU 87**



# PENDAISON

- **SUICIDE**

- 1 % des tentatives mais 43 % des décès

- Prédominance masculine, milieu carcéral, rural
    - Majorité des décès avant l'arrivée des secours.

# PENDAISON

- **JUSTICE**
  - Moyen-Orient
  - Pays anglo-saxon
- **ACCIDENTELLE**
  - Enfant
  - Jeu érotique
  - Jeu du Foulard



# MÉCANISMES LÉSIONNELS

- **TRANSMISSION PAR LE LIEN DE FORCES MECANIQUES AU NIVEAU DU COU**
  - **2 Kg : COMPRESSIONS JUGULAIRES**
  - **5 Kg : CAROTIDES**
  - **15 Kg : TRACHÉE, ARTERES VERTEBRALES**

# TYPE DE PENDAISON

- **COMPLÈTE**
  - LES PIEDS NE TOUCHENT PAS LE SOLS (70 %)
- **INCOMPLÈTE**
- **POSITION DU NOEUD**
  - ANTERIEUR OU POSTERIEUR (75 %)
  - LATERAL

# TYPE DE PENDAISON

- **NATURE DU LIEN**
  - **LARGE OU ETROIT**
  - **SILLON**
  - **RESISTANCE**



# Facteurs de gravité

- Hauteur de la chute
- Durée de la pendaison
- Lien étroit



# CONSEQUENCES

- **HYPOXIE / ANOXIE CEREBRALE**
- **OAP Lésionnel**
- **LESIONS LARYNX / TRACHÉE**
- **LESIONS RACHIS CERVICAL**
- **LESIONS ARTÉRIELLES**



# CLINIQUE

- **PHASE INITIALE**
  - **TROUBLES SENSORIELS**
- **PHASE CONVULSIVE**
- **ETAT DE MORT APPARENTE**

# **CONDUITE A TENIR DEVANT UNE PENDAISON RECENTE**

- **DEPENDRE**
  - **LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE**
  - **ATTENTION À LA CHUTE / RACHIS**
  - **SI IMPOSSIBLE : SOUTENIR**
  - **DEFAIRE LE LIEN**
- **ALERTE SECOURS**

## **CONDUITE A TENIR (2)**

- **SI ACR**
  - VOIR QUESTION
- **SUJET CONSCIENT**
  - LIBERTE VAS / O2
  - VV, MONITORAGE
  - MINERVE
- **SUJET COMATEUX**
  - IDEM
  - VIDANGE GASTRIQUE
  - REANIMATION SPECIALISEE



# **PRISE EN CHARGE HOSPITALIERE**

- **PRONOSTIC LIÉ À L'ANOXIE CEREBRALE**
- **CONDUITE ID SI ACR**