

AVIS

Actualisation de la posologie des vaccins pandémiques contre la grippe A(H1N1)2009 actuellement disponibles en France

11 décembre 2009

Suite à l'avis de l'Agence européenne des médicaments concernant les modifications apportées au résumé des caractéristiques du vaccin pandémique contre la grippe A(H1N1)2009 Pandemrix® en date du 3 décembre 2009, le Haut Conseil de la santé publique a actualisé ses recommandations concernant la posologie et l'utilisation des vaccins pandémiques :

	Pandemrix® Vaccin fragmenté avec adjuvant	Focetria® ¹ Vaccin fragmenté avec adjuvant	Panenza® Vaccin fragmenté sans adjuvant
Nourrissons âgés de 6 à 23 mois			2 demi-doses (2 x 0,25ml)*
Enfants âgés de 24 à 35 mois	1 demi-dose*** (1 x 0,25ml)	2 doses (2 x 0,50ml)*	2 demi-doses** (2 x 0,25ml)*
Enfants âgés de 3 à 8 ans	1 demi-dose (1 x 0,25ml)	2 doses (2 x 0,50ml)*	2 doses** (2 x 0,50ml)*
Enfants âgés de 9 ans	1 demi-dose (1 x 0,25ml)	1 dose (0,50ml)	1 dose** (1 x 0,50ml)
Personnes âgées de 10 à 59 ans	1 dose (1 x 0,50ml)	1 dose (0,50ml)	1 dose** (1 x 0,50ml)
Personnes âgées de 60 ans et plus	1 dose**** (1 x 0,50ml)	2 doses (2 x 0,50ml)*	2 doses** (2 x 0,50ml)*

*Les deux doses doivent être espacées d'au moins trois semaines, elles doivent être réalisées avec le même vaccin

**Le vaccin fragmenté sans adjuvant est recommandé pour des populations particulières définies dans l'avis du HCSP du 28 octobre 2009

*** Les données récentes validées par l'agence européenne du médicament montrent que chez les enfants de 6 à 35 mois une seule dose de 0,25ml de Pandemrix® procure une réponse qui satisfait les critères d'immunogénicité. L'administration d'une seconde dose 21 jours plus tard augmente la réponse immune mais majore les effets secondaires locaux et généraux (EMA, press release 4 décembre 2009)

**** Le vaccin fragmenté avec adjuvant Pandemrix® est préférentiellement recommandé dans cette tranche d'âge.

Avis produit par la Commission spécialisée Maladies transmissibles, sur proposition du Comité technique des vaccinations

Le 11 décembre 2009

¹ Le vaccin fragmenté avec adjuvant Focetria® n'a pas été évalué chez l'enfant, cependant l'Agence européenne du médicament a estimé que les posologies recommandées chez l'adulte étaient applicables à l'enfant.