



# Infections à transmission respiratoire Quel masque porter ?



Le patient suspect ou atteint d'une infection à transmission respiratoire « air » ou « gouttelettes » porte un masque chirurgical **dès l'entrée à l'hôpital**

Si le patient est suspect ou atteint d'une infection à transmission « **gouttelettes** »


Exemples : coqueluche, méningite à méningocoque, grippe saisonnière




Le soignant et les visiteurs portent **un masque chirurgical\*** pour entrer dans sa chambre

Si le patient est suspect ou atteint d'une infection à transmission « **air** »

Exemples : tuberculose, varicelle, rougeole



Le soignant et les visiteurs portent **un masque de protection respiratoire** pour entrer dans sa chambre



Le patient suspect ou atteint d'une infection à transmission respiratoire « air » ou « gouttelettes » porte un masque chirurgical pour tout **déplacement hors de sa chambre**

\*Sauf recommandations spécifiques concernant par exemple des agents émergents ou un geste à risque spécifique (exemple : fibroscopie bronchique).

**Bonnes pratiques d'utilisation**

- Consulter la notice d'emploi fournie par le fabricant.
- Ajuster le masque. Pour le masque de protection respiratoire, l'étanchéité doit être évaluée à chaque utilisation (*fit-check*) car la protection en dépend.
- Une fois en place, ne pas manipuler le masque.
- Après avoir enlevé et jeté le masque, réaliser une friction hydroalcoolique des mains.