

Protoxyde d'azote - Allaitement

Date de mise à jour : 28.05.2024

En association avec l'oxygène : **ACTYNOX®** - **ANTASOL®** - **ENTONOX®** - **KALINOX®** - **OXYNOX®** - **PACYNOX®**

Le protoxyde d'azote (N₂O) est un gaz anesthésique utilisé lors d'anesthésies générales, en adjuvant d'autres anesthésiques.

Il est également utilisé pour ses propriétés antalgiques, en mélange équimolaire avec l'oxygène (MEOPA), lors de gestes médicaux douloureux, de soins dentaires, et en obstétrique (travail, accouchement).

ETAT DES CONNAISSANCES

- Il n'y a pas de donnée publiée sur le protoxyde d'azote et l'allaitement.
- Cependant, la durée d'action du protoxyde d'azote est brève.

EN PRATIQUE

- Au vu des données disponibles sur le protoxyde d'azote (cf. Etat des connaissances), l'allaitement pourra être repris dès que les effets du protoxyde d'azote se sont dissipés et que la mère est en mesure de s'occuper de son enfant.
-

Consulter aussi sur notre site

Protoxyde d'azote - Grossesse

Anesthésie dentaire - Allaitement

Seuls quelques noms de spécialités sont mentionnés dans ce site. Cette liste est indicative et n'est pas exhaustive.

CRAT - Centre de Référence sur les Agents Tératogènes
Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP.Sorbonne Université - Paris
www.lecrat.fr

Copyright CRAT - Tous droits réservés